

INTRODUÇÃO:

A ingestão de embalagens contendo substâncias ilícitas pode causar complicações com risco de vida. A determinação de conduta, seja clínica ou cirúrgica, depende de exames de imagem, sendo a tomografia computadorizada (TC) a técnica mais recomendada. O objetivo deste relato de caso é descrever a indicação cirúrgica para retirada das embalagens de cocaína do trato gastrointestinal do paciente, com auxílio da TC.

RELATO DO CASO:

Paciente, 35 anos, masculino, chegou ao pronto-socorro por serviço de ambulância, com quadro de rebaixamento de nível de consciência e êmese. Após a TC de abdome, foi confirmada a hipótese inicial de ingestão de corpos estranhos. Inicialmente, determinou-se conduta clínica conservadora, com intuito de aguardar a progressão e evacuação espontânea. Após 48 horas, paciente evoluiu com hipertensão arterial persistente e taquicardia. Nova TC foi realizada, evidenciando ausência de progressão dos materiais ingeridos, com risco de rompimento das embalagens e extravasamento de conteúdo. Neste contexto, foi indicada laparotomia exploratória, com gastrotomia e colotomia em cólon descendente, com retirada de papelotes íntegros.

Não foram visualizados pontos isquêmicos em alças. No pós-operatório, paciente apresentou instabilidade hemodinâmica, bradipnéia importante e distúrbios hidroeletrólíticos, evoluindo para parada cardiorrespiratória. A reanimação cardiopulmonar fracassou, resultando em óbito.



Imagem 1: TC plano frontal, 12 papelotes hipodensos em cavidade gástrica dilatada.



Imagem 2: TC plano axial, diversos papelotes hipodensos e 1 hiperdenso em cavidade gástrica.

CONCLUSÃO:

O exame de TC é fundamental para avaliação da necessidade de laparotomia exploratória, em pacientes que ingerem embalagens de substâncias ilícitas. O manejo conservador é o tratamento de escolha, porém a intervenção cirúrgica por vezes é necessária, diante de sinais de degeneração dos papelotes, obstrução intestinal ou intoxicação exógena.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

De Bakker, J.K., Nanayakkara, P.W.B., Geeraedts, L.M.G. et al. Body packers: a plea for conservative treatment. *Langenbecks Arch Surg* 397, 125–130 (2012). <https://doi.org/10.1007/s00423-011-0846-z>

MODELLI, M., FRADE, R., ARANTES, L.C. Dissimulação de drogas no corpo humano para efeitos de tráfico. *Brasília Med* 45(4), 256-263 (2008). 2008). <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra022719>