

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DA SINDACTILIA

Marcella Rodrigues Costa Simões¹ ; Leandro Azevedo De Figueiredo² ; Bianca Gabriella De Oliveira³; Pedro Hemerly Figueiredo⁴ ; Melissa Alves Aires Marques⁵

1Complexo de Saúde São José de Deus; 2 Vitória Apart Hospital ; 3 Universidade Salvador ; 4 Hospital Santa Casa da Misericórdia; 5 Universidade Iguazu

INTRODUÇÃO

A sindactilia é um defeito congênito dos dedos das mãos ou dos pés que pode causar problemas estéticos e funcionais. Nesta condição existe um defeito na separação das partes, segundo a Classificação de Swanson, determinado entre a sexta e a oitava semana de vida intra-uterina e que representa aproximadamente 20% de todas as malformações da mão.

É uma das deformidades mais heterogêneas conhecidas na literatura, com variações unilaterais, bilaterais, simétricas e assimétricas. O objetivo é descrever um novo desenho de retalho cutâneo.

METODOLOGIA

Trata-se um estudo descritivo.



Figura 01: Pré operatório

DISCUSSÃO

Esta técnica mantém os princípios da abordagem da sindactilia, de reconstrução da comissura digital, restauração do leito ungueal e cobertura cutânea adequada, além de apresentar um novo retalho para tratamento, associado à cobertura de polipropileno, para solucionar as desvantagens do uso de enxerto de pele, como deformidades no sítio receptor e morbidade da área doadora.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a prótese de polipropileno promove a cicatrização das áreas cruentas, com o mesmo tom de pele local e sem crescimento anormal de pelos, o que é comum nos casos de enxerto de pele.



Figura 02: Pós operatório imediato